

# **Μαθηματικά**

**Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ**

**ΜΕΡΟΣ Α΄**

**Τόμος 1ος  
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1 – 1.4**

**Γ' Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ II / Ενέργεια 2.2.1 /  
Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:**

**«Αναμόρφωση των προγραμμάτων  
σπουδών και συγγραφή νέων  
εκπαιδευτικών πακέτων»**

**ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ**

**Δημήτριος Γ. Βλάχος**

**Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ**

**Πρόεδρος του Παιδαγωγ. Ινστιτούτου**

**Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων  
βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού  
εκπαιδευτικού υλικού με βάση το  
ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»**

**Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου**

**Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης**

**Σύμβουλος του Παιδαγωγ. Ινστιτούτου**

**Αναπληρωτής Επιστημ. Υπεύθ. Έργου**

**Γεώργιος Κ. Παληός**

**Σύμβουλος του Παιδαγωγ. Ινστιτούτου**

**Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου**

**Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγ. Ινστιτ.**

**Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από  
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και**

**25% από εθνικούς πόρους.**

## ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Δημήτριος Αργυράκης, *Μαθημ/κός,  
Εκπ/κός Β/θμιας Εκπαίδευσης*  
Παναγιώτης Βουργάνας, *Μαθ/κός,  
Εκπ/κός Β/θμιας Εκπαίδευσης*  
Κωνσταντίνος Μεντής, *Μαθημ/κός  
Εκπ/κός Β/θμιας Εκπαίδευσης*  
Σταματούλα Τσικοπούλου, *Μαθ/κός  
Εκπ/κός Β/θμιας Εκπαίδευσης*  
Μιχαήλ Χρυσοβέργης, *Σχολικός  
Σύμβουλος Μαθηματικών*

## ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Εμμανουήλ Μανατάκης, *Επίκ. Καθ.  
Πολυτεχν. Σχολής Παν/μίου Πατρών*  
Μιχαήλ Σαλίχος, *Σχολικός  
Σύμβουλος Μαθηματικών*  
Νικόλαος Παπαευστρατίου,  
*Μαθ/κός, Εκπ/κός Β/θμιας Εκπ/σης*

## ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Νικόλαος Μαρουλάκης,  
*Σκιτσογράφος - Εικονογράφος*

**ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ**

**Ευγενία Βελάγκου, Φιλολόγος**

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ  
ΣΥΓΓΡΑΦΗ**

**Δημήτριος Κοντογιάννης,  
Σύμβουλος του Παιδαγ. Ινστιτούτου**

**ΕΞΩΦΥΛΛΟ**

**Παναγιώτης Γράββαλος, Ζωγράφος**

**ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ**

**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ  
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ**

***Ομάδα Εργασίας***

***Αποφ. 16158/6-11-06 και***

***75142/Γ6/11-7-07 ΥΠΕΠΘ***

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**Δημήτριος Αργυράκης  
Παναγιώτης Βουργάνας  
Κωνσταντίνος Μεντής  
Σταματούλα Τσικοπούλου  
Μιχαήλ Χρυσοβέργης**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Μαθηματικά**

**Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ**

**ΜΕΡΟΣ Α΄**

**Τόμος 1ος  
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1 – 1.4**



# Πρόλογος

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου, έχει σκοπό να βοηθήσει εσένα το μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου, να κατανοήσεις και να εμπεδώσεις τις διάφορες μαθηματικές έννοιες και να αποκτήσεις τις αναγκαίες δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης σου. Η ύλη του βιβλίου είναι οργανωμένη σε δύο μέρη. Το Α΄ Μέρος περιλαμβάνει 5 Κεφάλαια που αναφέρονται στην Άλγεβρα, ενώ το Β΄ Μέρος περιλαμβάνει 2 Κεφάλαια που αναφέρονται στη Γεωμετρία και την Τριγωνομετρία. Κάθε Κεφάλαιο χωρίζεται σε ενότητες μαθημάτων. Σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται:

**1. Οι κύριοι στόχοι.** Στην αρχή κάθε ενότητας αναγράφονται οι κύριοι

στόχοι της, όπως διατυπώνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα, ώστε να ξέρεις πού σε οδηγεί ο καθηγητής σου.

**2. Η δραστηριότητα.** Οι δραστηριότητες είναι μια μεγάλη ποικιλία προβλημάτων, όσο το δυνατόν πιο κοντά στα ενδιαφέροντα σου, που οδηγούν στην αναγκαιότητα της εισαγωγής των εννοιών που θα διδαχθείς ή στην επανάληψη και διεύρυνση άλλων που έχεις ήδη διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις. Με κατάλληλα ερωτήματα γίνεται προσπάθεια να επικεντρωθεί η προσοχή σου σε ορισμένες ενέργειες που θα σου δώσουν την ευκαιρία να αναπτύξεις πρωτοβουλία, να διατυπώσεις τις ιδέες και απόψεις σου και να τις ανταλλάξεις με τους συμμαθητές σου.

**3. Το κυρίως μάθημα.** Περιλαμβάνει γνώσεις που πρέπει να αποκτήσεις, να συγκρατήσεις και να μπορείς να εφαρμόζεις, όπως ορισμούς και ιδιότητες, που θα σου επιτρέψουν να επιλύεις προβλήματα και να διατυπώνεις συλλογισμούς. Σε πολλές περιπτώσεις περιλαμβάνει αποδείξεις βασικών προτάσεων.

**4. Παραδείγματα - Εφαρμογές.** Πρόκειται για ένα σύνολο λυμένων ασκήσεων και προβλημάτων, που σκοπεύουν να σου δώσουν τη δυνατότητα να μάθεις πώς να αντιμετωπίζεις ανάλογες ασκήσεις, να διαπιστώσεις την ευρύτητα των εφαρμογών που έχουν τα Μαθηματικά, να αποκτήσεις νέες εμπειρίες στις μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και να διευρύνεις το πεδίο των γνώσεων σου.

**5. Ερωτήσεις κατανόησης.** Είναι απλά ερωτήματα ή σύντομα προβλήματα τα οποία πρέπει να μπορείς να απαντήσεις, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος.

**6. Προτεινόμενες ασκήσεις** και προβλήματα. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε για τη συλλογή και την ταξινόμηση των προτεινόμενων ασκήσεων και προβλημάτων. Από τις πιο απλές ασκήσεις ως τα πιο σύνθετα προβλήματα, έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί η χρησιμότητα τους σε κάθε τομέα εφαρμογής τους, (Φυσική - Χημεία - Οικονομία κ.τ.λ.) που ενδείκνυται για την ηλικία και τις γνώσεις σου, αλλά και σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Σε ορισμένες ενότητες περιλαμβάνονται συμπληρωματικά:

**- Θέματα από την Ιστορία των Μαθηματικών και Δραστηριότητες που στοχεύουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον σου ώστε να συνεισφέρουν στην κατανόηση των εννοιών και των μαθηματικών προβλημάτων στα οποία αναφέρονται.**

**- Διαθεματικά σχέδια εργασίας. Πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες θα αποτελέσουν θέματα για ομαδική έρευνα και συνεργασία.**

**Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν:**


**- Γενικές Επαναληπτικές ασκήσεις και προβλήματα και μια σύντομη Επανάληψη - Ανακεφαλαίωση με τις βασικότερες γνώσεις που αποτελούν τον πυρήνα του κεφαλαίου.**

**Το βιβλίο κλείνει με:**


**Απαντήσεις - Υποδείξεις των ασκήσεων και Ευρετήριο όρων.**

**Πιστεύουμε ότι το βιβλίο αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής και ότι οι γνώσεις που θα αποκτήσεις από αυτό θα σε βοηθήσουν στα επόμενα βήματα σου. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του βιβλίου αυτού εκτός από τη δική σου προσπάθεια, χρειάζεται και η αρμονική συνεργασία με τον καθηγητή σου.**

**Οι συγγραφείς**







$a^2$	$ab$
$ab$	$b^2$

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$



# **ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ**

**1.1** Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις)

**1.2** Μονώνυμο – Πράξεις με μονώνυμο

**1.3** Πολυώνυμο – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

**1.4** Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

**1.5** Αξιοσημείωτες ταυτότητες

**1.6** Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων

**1.7** Διαίρεση πολυωνύμων

**1.8** Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων

**1.9** Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

**1.10** Πράξεις ρητών παραστάσεων

Γενικές ασκήσεις 1ου κεφαλαίου  
Επανάληψη – Ανακεφαλαίωση

## 1.1. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις)



✓ Θυμάμαι τους πραγματικούς αριθμούς, τις τεχνικές και τις βασικές ιδιότητες των πράξεών τους.

✓ Εμπεδώνω τις ιδιότητες των δυνάμεων.



✓ Γνωρίζω τις ιδιότητες των ριζών και μαθαίνω να τις χρησιμοποιώ.

### **A** Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Πραγματικοί αριθμοί είναι όλοι οι αριθμοί που γνωρίσαμε στις προηγούμενες τάξεις.

Π.χ.  $\frac{3}{4}$ ,  $-\frac{5}{2}$ ,  $7,34$ ,  $\sqrt{2}$ ,  $3$ ,  $\pi$ ,  $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ,  $\sqrt{4}$ ,  $-0,5$ ,  $1 + \sqrt{3}$ ,  $6,1010010001\dots$

**Οι πραγματικοί αριθμοί αποτελούνται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς.**

**Ρητός λέγεται κάθε αριθμός που έχει ή μπορεί να πάρει τη μορφή**

**ενός κλάσματος  $\frac{\mu}{\nu}$ , όπου  $\mu, \nu$**

**ακέραιοι αριθμοί και  $\nu \neq 0$ .**

$$\frac{3}{4}, \quad -\frac{5}{2} = \frac{-5}{2}, \quad 7,34 = \frac{734}{100},$$

$$3 = \frac{3}{1}, \quad \sqrt{4} = 2 = \frac{2}{1}, \quad -0,5 = \frac{-5}{10}.$$

**Άρρητος λέγεται κάθε αριθμός που δεν είναι ρητός.**

$$\sqrt{2}, \quad \pi, \quad \frac{\sqrt{5}}{3}, \quad 1+\sqrt{3}, \quad 6,1010010001\dots$$


**ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ**

**ΑΡΙΘΜΟΙ**

**ΜΗΔΕΝ**

**ΘΕΤΙΚΟΙ**

**ΑΡΙΘΜΟΙ**



Κάθε πραγματικός αριθμός παριστάνεται μ' ένα σημείο πάνω σ' έναν άξονα.

Η απόλυτη τιμή ενός πραγματικού αριθμού  $a$  συμβολίζεται με  $|a|$  και είναι ίση με την απόσταση του σημείου, που παριστάνει τον αριθμό  $a$ , από την αρχή του άξονα.

Για παράδειγμα:  $|-2| = 2$ ,  $|2| = 2$ ,

$$|0| = 0, \quad \left| -\frac{3}{4} \right| = \frac{3}{4}$$

# Οι πράξεις στους πραγματικούς αριθμούς

## Πρόσθεση

- Για να προσθέσουμε δύο ομόσημους αριθμούς, προσθέτουμε τις απόλυτες τιμές τους και στο άθροισμά αυτό βάζουμε ως πρόσημο το κοινό τους πρόσημο.

$$+7 + 5 = +12$$

$$-7 - 5 = -12$$

- Για να προσθέσουμε δύο ετερόσημους αριθμούς, αφαιρούμε την μικρότερη απόλυτη τιμή από τη μεγαλύτερη και στη διαφορά αυτή βάζουμε πρόσημο, το πρόσημο του αριθμού που έχει τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή.

$$+5 - 7 = -2$$

$$-5 + 7 = +2$$

## Πολλαπλασιασμός

- Για να πολλαπλασιάσουμε δύο ομόσημους αριθμούς, πολλαπλασιάζουμε τις απόλυτες τιμές τους, και στο γινόμενο αυτό βάζουμε πρόσημο +

$$(+5) \cdot (+7) = +35$$

$$(-5) \cdot (-7) = +35$$

- Για να πολλαπλασιάσουμε δύο ετερόσημους αριθμούς, πολλαπλασιάζουμε τις απόλυτες τιμές τους, και στο γινόμενο αυτό βάζουμε πρόσημο -

$$(+5) \cdot (-7) = -35$$

$$(-5) \cdot (+7) = -35$$

**Οι ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού**

Για την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό ισχύουν οι ιδιότητες:

<b>Ιδιότητα</b>	<b>Πρόσθεση</b>	<b>Πολύπλασιασμός</b>
<b>Αντιμεταθετική</b>	$\alpha + \beta = \beta + \alpha$	$\alpha\beta = \beta\alpha$
<b>Προσεταιριστική</b>	$\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$	$\alpha(\beta\gamma) = (\alpha\beta)\gamma$
<b>Ουδέτερο</b>	$\alpha + 0 = \alpha$	$\alpha \cdot 1 = \alpha$
<b>Οποιοδήποτε</b>	$\alpha + (-\alpha) = 0$	$\alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = 1, \alpha \neq 0$
<b>Επιμεριστική</b>	$\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$	

Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι:

- $\alpha \cdot 0 = 0$ .
- Αν  $\alpha\beta = 0$ , τότε  $\alpha = 0$  ή  $\beta = 0$ .
- Δύο αριθμοί που έχουν άθροισμα μηδέν, λέγονται αντίθετοι.

**-3, 3**

- Δύο αριθμοί που έχουν γινόμενο τη μονάδα, λέγονται αντίστροφοι.

**$\frac{4}{5}$  ,  $\frac{5}{4}$**

## Αφαίρεση - Διαίρεση

Οι πράξεις της αφαίρεσης και της διαίρεσης γίνονται με τη βοήθεια της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού αντιστοίχως.

- Για να βρούμε τη διαφορά δύο αριθμών, προσθέτουμε στο μειωτέο τον αντίθετο του αφαιρετέου.

$$5 - 7 = 5 + (-7) = -2$$

$$5 - (-7) = 5 + (+7) = 12$$

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$$

- Για να βρούμε το πηλίκο δύο αριθμών ( $\alpha : \beta$ , ή  $\frac{\alpha}{\beta}$  με  $\beta \neq 0$ ), πολλαπλασιάζουμε το διαιρετέο με τον αντίστροφο του διαιρέτη.

$$-5 : 15 = -5 \cdot \frac{1}{15} = -\frac{5}{15} = -\frac{1}{3}$$

$$\alpha : \beta = \alpha \beta$$

$$\alpha : \beta = \alpha \cdot \frac{1}{\beta} \quad \text{ή} \quad \frac{\alpha}{\beta} = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$$



## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

**1** Να υπολογιστούν οι παραστάσεις:

$$\alpha) (-3) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) - \left(-\frac{1}{3} + 3\right) - \left(+\frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\beta) \frac{-3 + \frac{1}{2}}{2 - \frac{1}{3}}$$

### Λύση

$$\begin{aligned} \alpha) & (-3) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) - \left(-\frac{1}{3} + 3\right) - \left(+\frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \\ & = +\frac{9}{2} + \frac{1}{3} - 3 - \left(-\frac{1}{6}\right) = +\frac{9}{2} + \frac{1}{3} - 3 + \\ & + \frac{1}{6} = \frac{27}{6} + \frac{2}{6} - \frac{18}{6} + \frac{1}{6} = \frac{12}{6} = 2 \end{aligned}$$

β)

$$\frac{-3 + \frac{1}{2}}{2 - \frac{1}{3}} = \frac{-\frac{6}{2} + \frac{1}{2}}{\frac{6}{3} - \frac{1}{3}} = \frac{-\frac{5}{2}}{\frac{5}{3}} = -\frac{15}{10} = -\frac{3}{2}$$

**2** Αν  $\alpha + \beta = -3$  και  $\gamma + \delta = -5$ , να βρεθεί η αριθμητική τιμή της παράστασης  $A = -(\gamma - 2\alpha) + 2\left(\beta - \frac{\delta}{2}\right)$ .

## Λύση

$$\begin{aligned} A &= -(\gamma - 2\alpha) + 2\left(\beta - \frac{\delta}{2}\right) \\ &= -\gamma + 2\alpha + 2\beta - \delta = (\text{επιμεριστική} \\ &\hspace{15em} \text{ιδιότητα}) \\ &= 2\alpha + 2\beta - \gamma - \delta = (\text{αντιμεταθετική} \\ &\hspace{15em} \text{ιδιότητα}) \\ &= 2(\alpha + \beta) - (\gamma + \delta) = (\text{επιμεριστική} \\ &\hspace{15em} \text{ιδιότητα}) \\ &= 2(-3) - (-5) = \\ &= -6 + 5 = \\ &= -1 \end{aligned}$$



## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

**1** Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα σημειώνοντας «x» στην κατάλληλη θέση.

	-3	$\frac{1}{2}$	6	0,3	-0,8	$\sqrt{3}$	$\sqrt{16}$	3,14	$\pi$	$\frac{22}{7}$
Ακέραιος										
Ρητός										
Άρρητος										

**2** Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

α)  $-3 + 7 = \dots$       β)  $-6 + 6 = \dots$       γ)  $-2 - 9 = \dots$

δ)  $(-2) \cdot \frac{1}{3} = \dots$       ε)  $0 \cdot \left(-\frac{2}{7}\right) = \dots$       στ)  $\left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-\frac{5}{4}\right) = \dots$

ζ)  $(-6) : \left(-\frac{12}{5}\right) = \dots$       η)  $\left(-\frac{8}{5}\right) : (+4) = \dots$       θ)  $\left(-\frac{4}{3}\right) : \left(+\frac{4}{3}\right) = \dots$

**3** Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

α)  $(-3 \cdot 2 - 5)x = \dots\dots$

β)  $-3(2 - 5x) = \dots\dots$

γ)  $-3(2 - 5)x = \dots\dots$

δ)  $-2(x \dots \dots) = \dots + 6$

ε)  $(3 + x)(2 + y) = \dots\dots$

στ)  $4(\dots + \dots) = 12x + 8$

**4** Να επιλέξετε τη σωστή

απάντηση:

i) Αν δύο αριθμοί είναι αντίθετοι, τότε:

α) είναι ομόσημοι

γ) έχουν γινόμενο μηδέν

β) έχουν ίσες απόλυτες τιμές

δ) έχουν γινόμενο τη μονάδα.

ii) Αν δύο αριθμοί είναι αντίστροφοι, τότε:

α) είναι ετερόσημοι

β) έχουν άθροισμα μηδέν

γ) έχουν ίσες απόλυτες τιμές

δ) έχουν γινόμενο τη μονάδα.

**5** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες:

α) Οι αντίστροφοι αριθμοί είναι ομόσημοι.

β) Το άθροισμα δύο ομόσημων αριθμών είναι θετικός αριθμός.

γ) Η απόλυτη τιμή κάθε πραγματικού αριθμού είναι θετικός αριθμός.

δ) Δύο αριθμοί με γινόμενο θετικό και άθροισμα αρνητικό είναι αρνητικοί.

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



**1** Να κάνετε τις πράξεις:

α)  $2 + 3 \cdot 4 - 12 : (-4) + 1$

β)  $2 + 3 \cdot (4 - 12) : (-4 + 1)$

γ)  $-3 \cdot (-2) - 5 + 4 : (-2) - 6$

δ)  $-8 : (-3 + 5) - 4 \cdot (-2 + 6)$

**2** Τα αποτελέσματα των παρακάτω πράξεων σχηματίζουν το έτος που έγινε ένα γεγονός στη χώρα μας με παγκόσμιο ενδιαφέρον.


$$-(5 - 4) - (+2) + (-6 + 4) - (-7) = \square$$

$$4 - (-2 + 6 - 3) + (-9 + 6) = \square$$

$$14 + (-6 + 5 - 3) - (-4 - 1) \cdot (-2) = \square$$

$$(-3) \cdot (-2) + 4 - (+5) - (-1) : (-1) = \square$$

**3** Ένα αυτοκίνητο ξεκίνησε από τη θέση Ο, κινήθηκε πάνω στον άξονα  $x'x$  προς τα αριστερά στη θέση Β και στη συνέχεια προς τα δεξιά στη θέση Γ. Αν είναι  $OA = 5 \text{ km}$ , τότε να βρείτε πόσο διάστημα διήνυσε το αυτοκίνητο και πόσο μετακινήθηκε από την αρχική του θέση.



**4** Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

$$\alpha) \frac{2}{3} - \left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(+\frac{1}{12}\right)$$

$$\beta) -\left(-\frac{1}{3} + \frac{3}{2} - \frac{5}{6}\right) + \left(-\frac{1}{2} + \frac{5}{3} - \frac{11}{6}\right)$$

$$\gamma) -5 \cdot \frac{1}{2} - \frac{2}{3} - 5 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\right)$$

$$\delta) \left(1 - \frac{7}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{5}\right) - \frac{3}{5} \div \left(-\frac{2}{5} + \frac{2}{3}\right)$$

**5** Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

$$\alpha) \frac{-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - 1}{3 - \frac{1}{6} + \frac{1}{2}}$$

$$\beta) \frac{-2 \cdot 3 - \frac{1}{4}}{-2 \cdot \left(3 - \frac{1}{4}\right)}$$

$$\gamma) -7 + \frac{-3 - \frac{1}{3}}{-2 + \frac{1}{3}}$$

**6** Οι ελάχιστες θερμοκρασίες μιας πόλης το πρώτο δεκαήμερο του έτους ήταν:

1, -3, 0, 2, 1, -2, -5, 0, -3, -1.

Να βρείτε τη μέση ελάχιστη θερμοκρασία της πόλης το δεκαήμερο αυτό.



συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σύμβολο (+ ή -).

α)  $12 \dots 5 \dots 20 = -3$

β)  $-8 \dots 9 \dots 1 = 0$

γ)  $\frac{5}{4} \dots \frac{3}{4} \dots \frac{10}{4} = 3$

δ)  $-0,35 \dots 6,15 \dots 8,50 = 2$

**8** Να αποδείξετε τις παρακάτω ισότητες:

α)  $8 - (\alpha - \beta) + (\alpha - 5 - \beta) = 3$

β)  $2 - (\alpha + \beta - \gamma) - (4 + \gamma - \beta) - (-2 - \alpha) = 0$

$$\gamma) -2 \cdot (\alpha - 3) + \alpha \cdot (-7 + 9) - 3 \cdot (+2) = 0$$

**9** Αν  $x + y = -5$  και  $\omega + \varphi = -7$ , να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

$$A = 4 - (x - \omega) - (y - \varphi)$$

$$B = -(-5 - x + \varphi) + (-8 + y) - (\omega - 4)$$

**10** Αν  $\alpha, \beta$  είναι οι διαστάσεις ενός ορθογωνίου, που έχει περίμετρο 56 και  $\gamma, \delta$  οι διαστάσεις ενός άλλου ορθογωνίου, που έχει περίμετρο 32, να υπολογίσετε την παράσταση  $A = \alpha - (9 - 2\gamma) - (15 - \beta - 2\delta)$ .

**11** Να τοποθετήσετε καθέναν από τους παρακάτω αριθμούς -7, -6, -5, -3, 1, 2, 4, 5, 9 σε ένα τετράγωνο, ώστε τα τρία αθροίσματα να είναι ίσα μεταξύ τους.

$$\square + \square + \square = \blacksquare$$

$$\square + \square + \square = \blacksquare$$

$$\square + \square + \square = \blacksquare$$

## **B** Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Η δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό  $a$  και εκθέτη ένα φυσικό αριθμό  $n \geq 2$  συμβολίζεται με  $a^n$  και είναι το γινόμενο  $n$  παραγόντων ίσων με τον αριθμό  $a$ .

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

$$(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$$

Δηλαδή  $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n$

### **$n$ - παράγοντες**

Ορίζουμε ακόμη:  $a^1 = a$

$$a^0 = 1 \quad \text{με } a \neq 0$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{με } a \neq 0$$

Για τις δυνάμεις με εκθέτες ακέραιους αριθμούς και εφόσον αυτές ορίζονται, ισχύουν οι ιδιότητες:

Ιδιότητες	Παραδείγματα
$\alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu+\nu}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$
$\alpha^{\mu} : \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu-\nu}$	$3^5 : 3^3 = 3^{5-3} = 3^2$
$(\alpha\beta)^{\nu} = \alpha^{\nu}\beta^{\nu}$	$(2x)^2 = 2^2x^2 = 4x^2$
$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\nu} = \frac{\alpha^{\nu}}{\beta^{\nu}}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$
$(\alpha^{\mu})^{\nu} = \alpha^{\mu\nu}$	$(2^{-3})^{-2} = 2^6 = 64$
$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{-\nu} = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\nu}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^{-4} = \left(\frac{3}{2}\right)^4$

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



**1** Να υπολογιστούν οι παραστάσεις:

$$\alpha) \frac{(-2)^2 \cdot (-3)^3}{(3 \cdot 2^2)^2}$$

$$\beta) x^2 \cdot (x \cdot y^2)^3 : (x^2 \cdot y^3)^2$$

## Λύση

$$\begin{aligned}\alpha) \frac{(-2)^2 \cdot (-3)^3}{(3 \cdot 2^2)^2} &= \frac{2^2 \cdot (-3^3)}{3^2 \cdot (2^2)^2} = \\ &= \frac{-2^2 \cdot 3^3}{3^2 \cdot 2^4} = -\frac{3}{2^2} = -\frac{3}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta) x^2(xy^2)^3 : (x^2y^3)^2 &= \frac{x^2(xy^2)^3}{(x^2y^3)^2} = \\ &= \frac{x^2x^3(y^2)^3}{(x^2)^2(y^3)^2} = \frac{x^5y^6}{x^4y^6} = x\end{aligned}$$

**2** Αν  $x^3 \cdot y^2 = -3$ , να υπολογιστεί η παράσταση  $A = x^2 \cdot (x^2 \cdot y^3)^2 \cdot (x^{-1})^{-3}$

## Λύση

$$\begin{aligned}A &= x^2 \cdot (x^2 \cdot y^3)^2 \cdot (x^{-1})^{-3} = \\ &= x^2 \cdot x^4 \cdot y^6 \cdot x^3 = x^2 \cdot x^4 \cdot x^3 \cdot y^6 = \\ &= x^9 \cdot y^6 = (x^3 \cdot y^2)^3 = (-3)^3 = -27.\end{aligned}$$

**3** Να υπολογιστούν οι παραστάσεις:

$$A = (-2)^2 \cdot (-3) + 2 \cdot 3^2 - 5^2 \cdot (-2) : 5 - 6$$

$$B = (2 \cdot 5 - 3^2) + 2 \cdot (2^3 - 4) - 12 : (-3)$$

### Λύση

Η προτεραιότητα των πράξεων

- Πρώτα υπολογίζουμε τις δυνάμεις.
- Στη συνέχεια κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις.
- Τέλος, κάνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις.
- Όταν η παράσταση περιέχει και παρενθέσεις, εκτελούμε πρώτα τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις με τη σειρά που αναφέραμε παραπάνω.

$$\begin{aligned} A &= (-2)^2 \cdot (-3) + 2 \cdot 3^2 - 5^2 \cdot (-2) : 5 - 6 = \\ &= 4 \cdot (-3) + 2 \cdot 9 - 25 \cdot (-2) : 5 - 6 = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -12 + 18 + 50 : 5 - 6 = \\
 &= -12 + 18 + 10 - 6 = \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= (2 \cdot 5 - 3^2) + 2 \cdot (2^3 - 4) - 12 : (-3) = \\
 &= (2 \cdot 5 - 9) + 2 \cdot (8 - 4) - 12 : (-3) = \\
 &= 10 - 9 + 2 \cdot 4 - 12 : (-3) = \\
 &= 1 + 8 + 4 = \\
 &= 9 + 4 = \\
 &= 13
 \end{aligned}$$



## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

**1** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες:

α) Για κάθε αριθμό  $a$  ισχύει  
 $a + a + a + a = a^4$ .

β) Για κάθε αριθμό  $a$  ισχύει  
 $a \cdot a \cdot a \cdot a = a^4$ .

γ) Οι αριθμοί  $(-5)^6$  και  $-5^6$  είναι

αντίθετοι.

δ) Οι αριθμοί  $\left(\frac{2}{3}\right)^8$  και  $\left(\frac{3}{2}\right)^8$    
είναι αντίστροφοι.

ε) Για κάθε αριθμό  $a$  ισχύει  $(3a)^2 = 9a^2$ .

στ) Ο αριθμός  $-(-5)^2$  είναι θετικός.

ζ) Ο αριθμός  $-3^{-2}$  είναι θετικός.

**2** Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σύμβολο ( $=$  ή  $\neq$ ).

α)  $(-1)^6 \dots 1$       β)  $3^{-2} \dots 9$

γ)  $-4^2 \dots -16$       δ)  $\left(\frac{5}{2}\right)^{-1} \dots \frac{2}{5}$

ε)  $5^{-2} \dots \frac{1}{-25}$       στ)  $\left(\frac{2}{5}\right)^0 \dots 0$

$\left(-\frac{1}{2}\right)^5 \quad \frac{1}{32}$

ζ) ... η)  $(7 + 2)^2 \dots 7^2 + 2^2$

**3** Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

i) Η τιμή της παράστασης  $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$  είναι:

α)  $-\frac{4}{9}$     β)  $-\frac{9}{4}$     γ)  $\frac{9}{4}$     δ)  $\frac{4}{9}$

ii) Η τιμή της παράστασης  $[(-2)^0]^3$  είναι:

α)  $-2^3$     β)  $-6$     γ)  $2^3$     δ)  $1$

ii) Η τιμή της παράστασης  $2^3 + 3^2$  είναι:

α)  $5^5$     β)  $17$     γ)  $5^6$     δ)  $6^5$

**4** Να συμπληρώσετε τον πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε παράσταση της στήλης Α, το αποτέλεσμά της από τη στήλη Β.

	Στήλη Α	Στήλη Β
α.	$(2^4)^{-1}$	1. $\frac{1}{4}$
β.	$(2^{-5})^2 \cdot 2^{10}$	2. $-2^4$
γ.	$(-2)^{-2}$	3. 4
δ.	$(2^4 : 2^3) \cdot 2^2$	4. $2^3$
		5. $2^{-4}$
		6. 1

α	β	γ	δ

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



**1** Να γράψετε καθεμιά από τις παρακάτω παραστάσεις ως μία δύναμη:

α)  $2^{-5} \cdot 2^8$

β)  $3^4 : 3^{-2}$

γ)  $2^3 \cdot 5^3$

ε)  $3^{-2} \cdot (-3)^4$

στ)  $\frac{(-6)^6}{2^6}$

ζ)  $4^2 : 3^4$

$$\eta) 27 \cdot 3^4 \cdot \frac{1}{3^5}$$

**2** Να υπολογίσετε την τιμή κάθε παράστασης:

$$\alpha) (2^{-2})^3 \cdot 2^8 \qquad \beta) (-3)^2 \cdot (-3)^{-4}$$

$$\gamma) (0,75)^{-2} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 \qquad \delta) 36^3 : (-12)^3$$

$$\epsilon) (2,5)^4 \cdot (-4)^4 \qquad \sigma\tau) 4^{12} : 2^{20}$$

$$\zeta) \left(-\frac{2}{3}\right)^{12} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-14} \qquad \eta) (0,01)^3 \cdot 10^5$$

**3** Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

$$\alpha) (x^2)^3 \cdot 5x^4 \qquad \beta) (xy^3)^2 \cdot x^3y$$

$$\gamma) (-2x)^2 \cdot (-2x^2) \qquad \delta) \left(-\frac{2}{3}x\right)^3 : x^2$$

$$\epsilon) (-3x^2)^3 \quad (-2x^3)^2 \qquad \sigma\tau) \frac{3}{-2}x^3 : \left(-\frac{3}{2}x\right)^2$$

**4** Να υπολογίσετε την τιμή κάθε παράστασης:

$$A = 3 \cdot (-2)^2 + 4 - (-7)^0 \cdot 2 - 8 \cdot (2^{-1} - 1) - 2 \cdot 3^2$$

$$B = (-4)^2 : 2 - 5 - (-3) \cdot 2^2 - (-2)^4$$

$$\Gamma = (2,5)^2 \cdot (1,25)^3 \cdot (-4)^2 \cdot (-8)^3$$

$$\Delta = (25^7 \cdot 8^4) : (5^7 \cdot 40^4)$$

**5** Αν τριπλασιάσουμε την πλευρά ενός τετραγώνου, πόσες φορές μεγαλώνει το εμβαδόν του;

## Γ Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού



Η τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού  $x$  συμβολίζεται με  $\sqrt{x}$  και είναι ο θετικός

αριθμός που όταν υψωθεί στο τετράγωνο μας δίνει τον αριθμό  $x$ .

Π.χ.  $\sqrt{25} = 5$ , αφού  $5^2 = 25$  Ορίζουμε ακόμη  $\sqrt{0} = 0$ .

Όμως και  $(-5)^2 = 25$ , οπότε έχουμε  $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$ . Άρα, για κάθε πραγματικό αριθμό  $x$  ισχύει:

$$\sqrt{x^2} = |x| \quad \sqrt{(-7)^2} = |-7| = 7, \quad \sqrt{7^2} = 7$$

Δεν ορίζεται τετραγωνική ρίζα αρνητικού αριθμού, γιατί δεν υπάρχει αριθμός που το τετράγωνο του να είναι αρνητικός αριθμός.

Παρατηρούμε ακόμη ότι:

$$(\sqrt{9})^2 = 3^2 = 9, \text{ δηλαδή } (\sqrt{9})^2 = 9.$$

Γενικά

$$\text{Αν } x \geq 0, \text{ τότε } (\sqrt{x})^2 = x$$

## Ιδιότητες των ριζών

### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

**1.** Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σύμβολο ( $=$  ή  $\neq$ )

$$\sqrt{4} \cdot \sqrt{100} \dots \sqrt{4 \cdot 100}$$

$$\text{και } \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{100}} \dots \sqrt{\frac{4}{100}}$$

**2.** Με τη βοήθεια ενός υπολογιστή τσέπης να συμπληρώσετε και τα παρακάτω κενά:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} \dots \sqrt{2 \cdot 5} \quad \text{και} \quad \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \dots \sqrt{\frac{2}{5}}$$

Για τους αριθμούς 4 και 100 μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι ισχύουν:

$$\sqrt{4} \cdot \sqrt{100} = \sqrt{4 \cdot 100} \text{ και } \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{100}} = \sqrt{\frac{4}{100}}$$

Με τη βοήθεια ενός υπολογιστή τσέπης μπορούμε να καταλήξουμε σε ανάλογες ισότητες και για τους αριθμούς 2 και 5. Όσα όμως παραδείγματα κι αν εξετάσουμε, δεν αρκούν για να μας πείσουν, ότι οι σχέσεις αυτές είναι αληθείς για οποιουσδήποτε μη αρνητικούς αριθμούς. Μόνο μια απόδειξη μπορεί να μας πείσει.

## Γενικά

Για δύο μη αρνητικούς αριθμούς  $\alpha$ ,  $\beta$  μπορούμε να αποδείξουμε ότι:

- Το γινόμενο των τετραγωνικών ριζών τους ισούται με την τετραγωνική ρίζα του γινομένου τους.

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

- Το πηλίκο των τετραγωνικών ριζών τους ισούται με την τετραγωνική ρίζα του πηλίκου τους.

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad \text{με } b > 0$$

Για να αποδείξουμε την πρώτη ισότητα, υπολογίζουμε το τετράγωνο κάθε μέλους της ξεχωριστά.

- $(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \cdot (\sqrt{b})^2 = ab$
- $(\sqrt{ab})^2 = ab$

Παρατηρούμε, ότι οι δύο μη αρνητικοί αριθμοί  $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$  και  $\sqrt{ab}$  έχουν το ίδιο τετράγωνο  $ab$ , οπότε είναι ίσοι.

Άρα  $\sqrt{\alpha} \cdot \sqrt{\beta} = \sqrt{\alpha\beta}$  .

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αποδείξουμε και τη δεύτερη ισότητα.

Παρατηρούμε ακόμη ότι

$$\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7, \text{ ενώ}$$

$$\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$$

δηλαδή  $\sqrt{16} + \sqrt{9} \neq \sqrt{16 + 9}$  .

Γενικά:

Αν  $\alpha, \beta$  είναι θετικοί αριθμοί, τότε

$$\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta} \neq \sqrt{\alpha+\beta}$$

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



**1** Να αποδειχθεί ότι  $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$  και γενικά για μη αρνητικούς αριθμούς  $\alpha, \beta$  ότι ισχύει  $\sqrt{\alpha^2\beta} = \alpha\sqrt{\beta}$  .

## Λύση

Επειδή  $20 = 4 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5$  έχουμε  
 $\sqrt{20} = \sqrt{2^2 \cdot 5} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$  .

Ομοίως έχουμε

$$\sqrt{\alpha^2 \beta} = \sqrt{\alpha^2} \cdot \sqrt{\beta} = \alpha\sqrt{\beta} \text{ .}$$

► Ο αριθμός 20 μπορεί να αναλυθεί και με άλλον τρόπο σε γινόμενο παραγόντων π.χ.  $20 = 2 \cdot 10$ , αλλά τότε κανένας παράγοντας του δεν είναι τετράγωνο ενός θετικού ακέραιου αριθμού.

**2** Να αποδειχθεί ότι:

$$\alpha) 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

$$\beta) \sqrt{3} \cdot \sqrt{24} = 6\sqrt{2}$$

$$\gamma) \sqrt{50} - \sqrt{18} = 2\sqrt{2}$$

## Λύση

α) Με τη βοήθεια της επιμεριστικής ιδιότητας έχουμε:

$$3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = (3 + 2)\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned}\beta) \sqrt{3} \cdot \sqrt{24} &= \sqrt{3 \cdot 24} = \sqrt{72} = \\ &= \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma) \sqrt{50} - \sqrt{18} &= \sqrt{25 \cdot 2} - \sqrt{9 \cdot 2} = \\ &= \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} - \sqrt{9} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}\end{aligned}$$

**3** Να μετατραπεί το κλάσμα  $\frac{5}{\sqrt{3}}$ , που έχει άρρητο παρονομαστή, σε ισοδύναμο κλάσμα με ρητό παρονομαστή.


**Λύση**

Πολλαπλασιάζουμε και τους δύο όρους του κλάσματος με τον παρονομαστή.

$$\frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{(\sqrt{3})^2} = \frac{5\sqrt{3}}{3}$$

**4** Τα τετράγωνα  $ΑΒΓΔ$  και  $ΓΖΗΘ$  έχουν εμβαδόν  $12 \text{ m}^2$  και  $3 \text{ m}^2$  αντιστοίχως. Να βρεθεί το εμβαδόν του ορθογωνίου  $ΒΚΖΓ$  και το μήκος του τμήματος  $ΒΘ$ .

**Λύση**



Το εμβαδόν του τετραγώνου  $ΑΒΓΔ$  είναι  $ΒΓ^2 = 12 \text{ m}^2$ , οπότε η πλευρά του είναι  $ΒΓ = \sqrt{12} \text{ m}$ .

Το εμβαδόν του τετραγώνου  $ΓΖΗΘ$  είναι  $ΓΖ^2 = 3 \text{ m}^2$ , οπότε η πλευρά του είναι  $ΓΖ = \sqrt{3} \text{ m}$ . Επομένως Το

εμβαδόν του ορθογωνίου ΒΚΖΓ  
είναι:

$$E = ΒΓ \cdot ΓΖ = \sqrt{12} \cdot \sqrt{3} = \\ = \sqrt{12 \cdot 3} = \sqrt{36} = 6 \text{ m}^2.$$

Το μήκος του τμήματος ΒΘ είναι:

$$ΒΘ = ΒΓ + ΓΘ = ΒΓ + ΓΖ = \sqrt{12} + \sqrt{3} = \\ = \sqrt{4 \cdot 3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3} + \sqrt{3} = 3\sqrt{3} \text{ m}.$$



## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

**1** Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

α)  $3\sqrt{3} + \sqrt{3} = \dots$       β)  $5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = \dots$

γ)  $\sqrt{5} + 4\sqrt{5} - 5\sqrt{5} = \dots$       δ)  $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3} = \dots$

ε)  $\sqrt{18} : \sqrt{2} = \dots$       στ)  $3\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \dots$

**2** Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε στοιχείο της στήλης Α ένα στοιχείο από τη στήλη Β.

Στήλη Α		Στήλη Β
α.	$\sqrt{25}$	1. -5
β.	$\sqrt{-25}$	
γ.	$-\sqrt{25}$	2. δεν ορίζεται
δ.	$\sqrt{5^2}$	
ε.	$\sqrt{(-5)^2}$	3. 5
στ.	$\sqrt{-5^2}$	

α	β	γ	δ	ε	στ

**3** Να συμπληρώσετε τους πίνακες:

**Άθροισμα**

α	β	$\sqrt{\alpha}$	$\sqrt{\beta}$	$\sqrt{\alpha + \beta}$	$\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}$
4	1				
9	16				
64	36				

## Γινόμενο

$\sqrt{αβ}$	$\sqrt{α} \cdot \sqrt{β}$

## Πηλίκο

$\frac{\sqrt{α}}{\sqrt{β}}$	$\frac{\sqrt{α}}{\sqrt{β}}$

**4** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες.

α)  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$

β)  $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$

γ)  $\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$

δ)  $\sqrt{(-3)^2} = 3$

ε)  $\sqrt{\left(\frac{1}{2} - 1\right)^2} = \frac{1}{2} - 1$

στ) Το διπλάσιο του  $\sqrt{5}$  είναι το  $\sqrt{10}$ .

ζ) Το μισό του  $\sqrt{12}$  είναι το  $\sqrt{3}$ .

**5** Ένα τετράγωνο έχει εμβαδόν  $50 \text{ m}^2$ . Είναι σωστό να ισχυριστούμε ότι η πλευρά του είναι  $5\sqrt{2} \text{ m}$ ;

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



**1** Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

α)  $3\sqrt{5} - 7\sqrt{5} + 2\sqrt{5}$

β)  $5\sqrt{7} - 8\sqrt{3} - 2\sqrt{7} + 4\sqrt{3}$

γ)  $\sqrt{\frac{5}{2}} \cdot \sqrt{\frac{5}{8}} - \sqrt{\frac{3}{7}} \cdot \sqrt{\frac{12}{7}}$

δ)  $\sqrt{\frac{14}{5}} \cdot \sqrt{\frac{10}{7}} + \sqrt{\frac{21}{2}} \cdot \sqrt{\frac{14}{3}}$

**2** Να αποδείξετε τις ισότητες:

α)  $3\sqrt{2} - \sqrt{50} + \sqrt{32} - 6\sqrt{8} = -10\sqrt{2}$

β)  $\sqrt{27} - \sqrt{20} + \sqrt{12} - \sqrt{5} = 5\sqrt{3} - 3\sqrt{5}$

γ)  $\sqrt{3} \cdot \sqrt{18} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{48} + \frac{\sqrt{120}}{\sqrt{5}} = \sqrt{6}$

$$\delta) \sqrt{3,6} \cdot \sqrt{4,9} - \sqrt{0,8} \cdot \sqrt{0,2} = 3,8$$

**3** Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

$$\alpha) \sqrt{12 + \sqrt{16}} \quad \beta) \sqrt{86 + 2\sqrt{52} - \sqrt{9}}$$

$$\gamma) \sqrt{6\sqrt{12\sqrt{3\sqrt{9}}}}$$

**4** Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τις περιμέτρους και τα εμβαδά των ορθογωνίων ΑΒΓΔ, ΕΖΗΘ και ΚΛΜΝ. Ποιο από τα ορθογώνια έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν;

	μήκος	πλάτος	περί- μετρος	εμβα- δόν
ΑΒΓΔ	$5\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$		
ΕΖΗΘ	$4\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$		
ΚΛΜΝ	$3\sqrt{2}$	$3\sqrt{2}$		

**5** Να κάνετε τις πράξεις:

$$\alpha) \sqrt{2} (\sqrt{18} + \sqrt{8}) \quad \beta) \sqrt{6} (\sqrt{27} - \sqrt{3})$$

$$\gamma) (\sqrt{75} + \sqrt{45} - \sqrt{300}) : \sqrt{15}$$

$$\delta) (\sqrt{7} - \sqrt{5}) (\sqrt{7} + \sqrt{5})$$

**6** Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα, που έχουν άρρητους παρονομαστές, σε ισοδύναμα κλάσματα με ρητούς παρονομαστές.

$$\alpha) \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \beta) \frac{4}{\sqrt{6}} \quad \gamma) \frac{5}{2\sqrt{5}} \quad \delta) \frac{2\sqrt{3} + \sqrt{6}}{\sqrt{3}}$$

**7** Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \sqrt{5} + x = 3\sqrt{5} - x \quad \beta) \sqrt{6} x = \sqrt{24}$$

$$\gamma) \frac{x}{\sqrt{2}} = \sqrt{32} \quad \delta) 3\sqrt{3} - x = \sqrt{27}$$

**8** Να αποδείξετε ότι:


$$(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1) = 2.$$

Χρησιμοποιώντας την προηγούμενη ισότητα να μετατρέψετε το

κλάσμα  $\frac{1}{\sqrt{3} - 1}$ , που έχει άρρητο

παρονομαστή, σε ισοδύναμο με ρητό παρονομαστή.

**9** Αν τα τετράγωνα  $AB\Gamma\Delta$ ,  $\Gamma EZH$  έχουν εμβαδόν  $50\text{ m}^2$  και  $8\text{ m}^2$  αντιστοίχως, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τετραγώνου  $B\Theta IE$  είναι  $98\text{ m}^2$ .




**10** Στις κάθετες πλευρές  $AB = 3\text{ cm}$  και  $A\Gamma = 6\text{ cm}$  ορθογωνίου τριγώνου  $AB\Gamma$ , να πάρετε αντιστοίχως τα σημεία  $\Delta$ ,  $E$ , έτσι ώστε  $A\Delta = 2\text{ cm}$  και  $AE = 1\text{ cm}$ . Να αποδείξετε ότι  $B\Gamma = 3\Delta E$ .

**11** Στο ισοσκελές τρίγωνο  $AB\Gamma$  ( $AB = A\Gamma$ ), το ύψος  $A\Delta = 4$  cm και η πλευρά  $B\Gamma = 4$  cm.

α) Να υπολογίσετε την πλευρά  $A\Gamma$  και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι η περίμετρος του τριγώνου  $AB\Gamma$  είναι  $4 + 4\sqrt{5}$  cm.

β) Στην προηγούμενη ερώτηση 4 μαθητές έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις:

$4 + \sqrt{20}$ ,  $4 + 2\sqrt{20}$ ,  $8\sqrt{5}$ ,  $2(2 + \sqrt{20})$ .  
Ποιες από αυτές είναι σωστές;



## 1.2. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα



✓ Μαθαίνω τι είναι αλγεβρική παράσταση και πώς βρίσκεται η αριθμητική τιμή της.






✓ Διακρίνω αν μια αλγεβρική παράσταση είναι μονώνυμο και προσδιορίζω το βαθμό του.

✓ Μαθαίνω να κάνω πράξεις με μονώνυμα.

### A Αλγεβρικές παραστάσεις - Μονώνυμα

#### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν των κίτρινων σχημάτων.



**2. Στο πράσινο σχήμα φαίνεται η κάτοψη ενός καταστήματος που πρόκειται να στρωθεί με πλακάκια. Να εξηγήσετε γιατί τα πλακάκια που θα χρειαστούν έχουν συνολικό εμβαδόν  $2x^2 + xy$ . Αν  $x = 5$  και  $y = 8$ , ποιο είναι το συνολικό εμβαδόν τους;**

## **Αλγεβρικές παραστάσεις**

**Πολλές φορές για να λύσουμε ένα πρόβλημα, καταλήγουμε σε εκφράσεις που περιέχουν μόνο αριθμούς και γι' αυτό ονομάζονται αριθμητικές παραστάσεις.**

$$6 \cdot 5 + 2 \cdot 8, \quad 2 \cdot 5^2 + 5 \cdot 8$$

**Υπάρχουν όμως και προβλήματα στα οποία καταλήγουμε σε εκφράσεις οι οποίες, εκτός από αριθμούς, περιέχουν και**

μεταβλητές. Οι εκφράσεις αυτές λέγονται αλγεβρικές παραστάσεις.

$$4x, \quad 2\alpha + 2\beta, \quad x^2, \quad \alpha\beta, \\ \frac{2x}{y^3}, \quad 2x^2 + xy$$

Ειδικότερα μια αλγεβρική παράσταση λέγεται ακέραια, όταν μεταξύ των μεταβλητών της σημειώνονται μόνο οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού και οι εκθέτες των μεταβλητών της είναι φυσικοί αριθμοί.

$$2x + 3x^2, \quad \frac{1}{2}\alpha + \beta^2, \quad \frac{4}{3}nR^3$$

Αν σε μια αλγεβρική παράσταση αντικαταστήσουμε τις μεταβλητές με αριθμούς και κάνουμε τις πράξεις, θα προκύψει ένας αριθμός που λέγεται αριθμητική τιμή ή

απλά τιμή της αλγεβρικής παράστασης.

Για παράδειγμα, η τιμή της αλγεβρικής παράστασης  $2x^2 + xy$  για  $x = 5$  και  $y = 8$ , είναι  $2 \cdot 5^2 + 5 \cdot 8 = 90$ .

## Μονώνυμα

Οι ακέραιες αλγεβρικές παραστάσεις, στις οποίες μεταξύ των μεταβλητών σημειώνεται μόνο η πράξη του πολλαπλασιασμού, λέγονται **μονώνυμα**.

$$4x, x^2, \frac{2}{3}αβ, \sqrt{2}x^4y^2ω^3$$

Σ' ένα μονώνυμο ο αριθμητικός παράγοντας λέγεται **συντελεστής** του μονωνύμου, ενώ το γινόμενο όλων των μεταβλητών του με τους αντίστοιχους εκθέτες τους λέγεται **κύριο μέρος** του μονωνύμου.

**Μονώνυμο**

$$2x^3y$$

**συντελεστής**

**κύριο μέρος**

Ο εκθέτης μιας μεταβλητής λέγεται βαθμός του μονωνύμου ως προς τη μεταβλητή αυτή, ενώ ο βαθμός του μονωνύμου ως προς όλες τις μεταβλητές του λέγεται το άθροισμα των εκθετών των μεταβλητών του.

**Το μονώνυμο  $2x^3y$  είναι:**

**$3^{\text{ου}}$  βαθμού ως προς  $x$**

**$1^{\text{ου}}$  βαθμού ως προς  $y$**

**$4^{\text{ου}}$  βαθμού ως προς  $x$  και  $y$**

Τα μονώνυμα που έχουν το ίδιο κύριο μέρος λέγονται όμοια.

Για παράδειγμα τα μονώνυμα  $\frac{2}{5}x^3y\omega^2$ ,  $-5x^3y\omega^2$ ,  $x^3y\omega^2$ , είναι όμοια

Τα όμοια μονώνυμα που έχουν τον ίδιο συντελεστή λέγονται ίσα ενώ, αν έχουν αντίθετους συντελεστές, λέγονται αντίθετα.

Για παράδειγμα τα μονώνυμα  $2x^3y$  και  $-2x^3y$  είναι αντίθετα.

Συμφωνούμε ακόμη να θεωρούνται και οι αριθμοί ως μονώνυμα και τα ονομάζουμε σταθερά μονώνυμα. Ειδικότερα, ο αριθμός 0 λέγεται μηδενικό μονώνυμο και δεν έχει βαθμό, ενώ όλα τα άλλα σταθερά μονώνυμα είναι μηδενικού βαθμού. Για παράδειγμα, ο αριθμός 5 είναι σταθερό μονώνυμο μηδενικού βαθμού.



## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

**1** Να βρεθεί η αριθμητική τιμή των παραστάσεων

α)  $-3x^2y^3$ , για  $x = -2$  και  $y = -1$

β)  $2\alpha^2 - 3\beta + 6$  για  $\alpha = -3$  και  $\beta = 8$

### Λύση

α) Η αριθμητική τιμή της παράστασης  $-3x^2y^3$  για  $x = -2$  και  $y = -1$  είναι:  
 $-3 \cdot (-2)^2 \cdot (-1)^3 = -3 \cdot (+4) \cdot (-1) = 12$

β) Η αριθμητική τιμή της παράστασης  $2\alpha^2 - 3\beta + 6$  για  $\alpha = -3$  και  $\beta = 8$  είναι:

$$2 \cdot (-3)^2 - 3 \cdot 8 + 6 = 2 \cdot (+9) - 24 + 6 = 18 - 24 + 6 = 0.$$

**2** Το ιδανικό βάρος  $B$  (σε κιλά) ενός ενήλικα, ύψους  $u$  (σε cm) δίνεται από τον τύπο  $B = \kappa \left( u - 100 + \frac{t}{10} \right)$ ,

όπου  $t$  είναι η ηλικία του (σε έτη) και  $\kappa$  μια σταθερά (για τον άνδρα  $\kappa = 0,9$  και για τη γυναίκα  $\kappa = 0,8$ ). Να βρεθεί ποιο είναι το ιδανικό βάρος για έναν άνδρα και μια γυναίκα, από τους οποίους ο καθένας είναι 30 ετών και έχει ύψος 1,77 m.

### Λύση


α) Το ιδανικό βάρος  $B$  (σε κιλά) ενός άνδρα ηλικίας 30 ετών και ύψους 1,77 m = 177 cm, είναι

$$\begin{aligned} B &= 0,9 \cdot \left( 177 - 100 + \frac{30}{10} \right) = \\ &= 0,9 \cdot (177 - 100 + 3) = 0,9 \cdot 80 = \\ &= 72 \text{ κιλά.} \end{aligned}$$

Το ιδανικό βάρος  $B$  (σε κιλά) μιας γυναίκας ηλικίας 30 ετών και ύψους 1,77 m = 177 cm, είναι

$$\begin{aligned} B &= 0,8 \cdot \left( 177 - 100 + \frac{30}{10} \right) = \\ &= 0,8 \cdot (177 - 100 + 3) = \\ &= 0,8 \cdot 80 = 64 \text{ κιλά.} \end{aligned}$$

**3** Να βρεθεί το μονώνυμο που εκφράζει το εμβαδόν του χρωματισμένου μέρους, το οποίο περιέχεται μεταξύ του τετραγώνου και του κύκλου. Να προσδιοριστεί ο συντελεστής του, το κύριο μέρος του και ο βαθμός του. Να υπολογιστεί η αριθμητική τιμή του για  $\rho = 10 \text{ cm}$ .



### Λύση

Το τετράγωνο έχει πλευρά  $2\rho$ , οπότε το εμβαδόν του είναι  $(2\rho)^2 = 4\rho^2$ . Επειδή το εμβαδόν του κύκλου είναι  $\pi\rho^2$ , το χρωματισμένο μέρος έχει εμβαδόν  $4\rho^2 - \pi\rho^2$ . Με την επιμεριστική ιδιότητα η παράσταση  $4\rho^2 - \pi\rho^2$  γράφεται  $4\rho^2 - \pi\rho^2 = (4 - \pi)\rho^2 = (4 - 3,14)\rho^2 = 0,86\rho^2$

Άρα είναι μονώνυμο δευτέρου βαθμού με συντελεστή  $0,86$  και

κύριο μέρος  $\rho^2$ . Η αριθμητική τιμή του για  $\rho = 10 \text{ cm}$  είναι  $0,86 \cdot 102 = 0,86 \cdot 100 = 86 \text{ cm}^2$ .



## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

**1** Ποιες από τις παρακάτω αλγεβρικές παραστάσεις είναι μονώνυμα;

α)  $-3x^2y$     β)  $3 + x^2y$     γ)  $\frac{x^3y}{\omega^2}$   
δ)  $2x^2y\omega^3$     ε)  $(3 - \sqrt{2})\alpha\beta^3$     στ)  $\frac{2}{3}\alpha\beta\gamma^3$

**2** Ποια από τα παρακάτω μονώνυμα είναι όμοια:

α)  $6x^2y^2$     β)  $-\frac{3}{5}xy^3$     γ)  $-x^3y\omega$   
δ)  $-5y^3x$     ε)  $\frac{\omega y x^3}{4}$     στ)  $\frac{5}{2}y^2x^2$   
ζ)  $\frac{xy^3}{7}$     η)  $-x^2y^2$     θ)  $yx^3\omega$     ι)  $\sqrt{2}xy^3$


**3** Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Μονώ- νυμο	Συντε- λεστής	Κύριο μέρος	Βαθμός ως προς x	Βαθμός ως προς y	Βαθμός ως προς x και y
$5xy^4$					
$-xy^2$					
$\frac{1}{7}x^2y^2$					
$-\sqrt{3}x^4$					

**4** Ένα μονώνυμο έχει συντελεστή  $-\frac{1}{3}$  και κύριο μέρος  $xy^2\omega^3$ . Να βρείτε το ίσο του και το αντίθετο μονώνυμο του.

5 **Να λύσετε το σταυρόλεξο.**

72 / 28



## ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Έκφραση που περιέχει αριθμούς και μεταβλητές συνδεδεμένες με τα σύμβολα των πράξεων (δύο λέξεις).
2. Είναι τα μονώνυμα  $8, -5, 0, 3$ .
3. Είναι ο βαθμός του μονωνύμου  $3x^2y$  ως προς  $y$ .
4. Στο μονώνυμο  $-2x^2y$  είναι το  $-2$ .
5. Είναι τα μονώνυμα  $-\frac{6}{2}x^3y, -3x^3y$ .
6. Ο συντελεστής του μονωνύμου  $xy$ .
7. Είναι το  $xy^2$  στο μονώνυμο  $4xy^2$  (δύο λέξεις).
8. Η απλούστερη αλγεβρική παράσταση.

## ΚΑΘΕΤΑ

1. Το μονώνυμο αυτό δεν έχει βαθμό.
2. Στο μονώνυμο  $7x^4y^5$  ως προς  $x$  είναι 4.
3. Παράσταση που μεταξύ των μεταβλητών της σημειώνονται μόνο οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού.
4. Είναι τα μονώνυμα  $5xy^2$ ,  $-\sqrt{25}xy^2$ .
5. Είναι τα μονώνυμα  $4\alpha^2\beta^5$ ,  $-\alpha^2\beta^5$ .
6. Η.....του μονωνύμου  $-2x^2y$  για  $x = 2$  και  $y = -1$  είναι 8.
7. Είναι ο βαθμός των σταθερών μονωνύμων 6, -3, 7.
8. Η πράξη αυτή δε σημειώνεται μεταξύ των μεταβλητών ενός μονωνύμου.

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



**1** Να βρείτε την αριθμητική τιμή των αλγεβρικών παραστάσεων:

α)  $-2xy^3 + x^2y - 4$  για  $x = -2$  και  $y = 1$

β)  $\frac{2}{3}x\omega^2 + \frac{1}{2}\omega^3$  για  $x = 3$  και  $\omega = -2$

**2** Ένα μονώνυμο έχει συντελεστή  $-\frac{5}{7}$  και μεταβλητές  $\alpha, \beta$ . Να προσδιορίσετε το μονώνυμο, αν ο βαθμός του ως προς  $\alpha$  είναι 2 και ως προς  $\beta$  είναι 5.

**3** Να προσδιορίσετε την τιμή του φυσικού αριθμού  $n$ , ώστε το μονώνυμο  $3x^n y^2$

α) να είναι μηδενικού βαθμού ως προς  $x$


β) να είναι πέμπτου βαθμού ως προς  $x$  και  $y$

γ) να έχει αριθμητική τιμή 48, για  $x = 2$  και  $y = -1$ .

**4** Να βρείτε τους αριθμούς  $\kappa$ ,  $\lambda$ ,  $\nu$ , ώστε τα μονώνυμα  $4x^3y^\nu$ ,  $\lambda x^\kappa y^2$  να είναι:

α) όμοια    β) ίσα    γ) αντίθετα

**5** Να γράψετε τα μονώνυμα που εκφράζουν το εμβαδόν και τον όγκο μιας σφαίρας που έχει ακτίνα  $\rho$ . Να προσδιορίσετε το συντελεστή, το κύριο μέρος και το βαθμό κάθε μονωνύμου. Ποια είναι η αριθμητική τιμή κάθε μονωνύμου, όταν  $\rho = 10$ ;




**6** Μια ομάδα καλαθοσφαίρισης έδωσε 9 αγώνες. Να γράψετε μια αλγεβρική παράσταση που

εκφράζει τους βαθμούς που συγκέντρωσε, αν σε κάθε νίκη παίρνει 2 βαθμούς και σε κάθε ήττα 1 βαθμό.



**7** Να γράψετε την αλγεβρική παράσταση που εκφράζει το εμβαδόν του τετραγώνου ΒΓΔΕ. Ποιο είναι το εμβαδόν, όταν  $x = 12$ ;



## **B** Πράξεις με μονώνυμα

Οι μεταβλητές ενός μονωνύμου αντιπροσωπεύουν αριθμούς και γι' αυτό στις πράξεις που γίνονται μεταξύ μονωνύμων ισχύουν όλες οι ιδιότητες των πράξεων που ισχύουν και στους αριθμούς.

### **Πρόσθεση μονωνύμων**

Ένα άθροισμα ομοίων μονωνύμων π.χ.  $-5x^3 + 2x^3$  με τη βοήθεια της επιμεριστικής ιδιότητας γράφεται  $-5x^3 + 2x^3 = (-5 + 2)x^3 = -3x^3$

**Παρατηρούμε ότι:**

Το άθροισμα ομοίων μονωνύμων είναι μονώνυμο όμοιο με αυτά και έχει συντελεστή το άθροισμα των συντελεστών τους.

Σύμφωνα με τον προηγούμενο κανόνα, έχουμε  $-12x^2y - 3x^2y = -15x^2y$ .

Αν τα μονώνυμα δεν είναι όμοια, όπως τα  $3x$  και  $5y$ , τότε το άθροισμά τους  $3x + 5y$  δεν είναι μονώνυμο.

## Πολλαπλασιασμός μονωνύμων

Ένα γινόμενο μονωνύμων π.χ.

$(-2x)(3x^2y)$  με τη βοήθεια των ιδιοτήτων του πολλαπλασιασμού και των δυνάμεων γράφεται

$$\begin{aligned} (-2x)(3x^2y) &= (-2)x \cdot 3x^2y = \\ &= (-2) \cdot 3(x \cdot x^2)y = -6x^3y. \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι:

Το γινόμενο μονωνύμων είναι μονώνυμο με:

- **συντελεστή** το γινόμενο των συντελεστών τους και

- κύριο μέρος το γινόμενο όλων των μεταβλητών τους με εκθέτη κάθε μεταβλητής το άθροισμα των εκθετών της.

Σύμφωνα με τον προηγούμενο κανόνα έχουμε

$$\left(-3x^4y^3\omega\right)\left(\frac{2}{5}x\omega^3\right) = -\frac{6}{5}x^5y^3\omega^4.$$

### Διαίρεση μονωνύμων

Η διαίρεση μονωνύμων, όπως και η διαίρεση αριθμών γίνεται, αν πολλαπλασιάσουμε το διαιρετέο με τον αντίστροφο του διαιρέτη.

Για παράδειγμα,

$$\left(-12x^4y\omega^2\right) : \left(4x^2y\omega\right) =$$

$$= -12x^4y\omega^2 \cdot \frac{1}{4x^2y\omega} = \frac{-12x^4y\omega^2}{4x^2y\omega} =$$

$$= -\frac{12}{4} \cdot \frac{x^4}{x^2} \cdot \frac{y}{y} \cdot \frac{\omega^2}{\omega} = -3x^2\omega.$$

Ομοίως έχουμε:

$$(7xy^4) : (-x^3y) = \frac{7xy^4}{-x^3y} = -\frac{7y^3}{x^2}$$

Παρατηρούμε ότι στο πρώτο παράδειγμα το πηλίκο των μονωνύμων είναι μονώνυμο, ενώ στο δεύτερο παράδειγμα δεν είναι μονώνυμο.

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



**1** Να γίνουν οι πράξεις:

$$\alpha) -7ax^2 - \frac{1}{2}ax^2 + 4ax^2$$

$$\beta) \left(-\frac{2}{3}xy^2\right) \cdot \left(-\frac{1}{4}x^3y^2\right)$$

$$\gamma) \left(\frac{3}{4}a^3\beta\right) : \left(-\frac{1}{2}a\beta^3\right)$$

## Λύση

$$\alpha) -7\alpha x^2 - \frac{1}{2}\alpha x^2 + 4\alpha x^2 =$$

$$= \left(-7 - \frac{1}{2} + 4\right)\alpha x^2 = \left(-\frac{14}{2} - \frac{1}{2} + \frac{8}{2}\right)\alpha x^2 =$$

$$= -\frac{7}{2}\alpha x^2$$


$$\beta) \left(-\frac{2}{3}xy^2\right) \cdot \left(-\frac{1}{4}x^3y^2\right) = \frac{2}{12}x^4y^4 =$$

$$= \frac{1}{6}x^4y^4$$

$$\gamma) \left(\frac{3}{4}\alpha^3\beta\right) : \left(-\frac{1}{2}\alpha\beta^3\right) = \frac{3\alpha^3\beta}{4} : \left(-\frac{\alpha\beta^3}{2}\right) =$$

$$= \frac{3\alpha^3\beta}{4} \cdot \left(-\frac{2}{\alpha\beta^3}\right) = -\frac{6\alpha^3\beta}{4\alpha\beta^3} = -\frac{3\alpha^2}{2\beta^2}$$

**2** Από το σημείο A αφήνουμε ένα σώμα να πέσει στο έδαφος. Αν ο χρόνος  $t$  σε sec που μεσολαβεί μέχρι να φτάσει στο έδαφος είναι διπλάσιος του χρόνου που θα έκανε, αν το αφήναμε να πέσει από το σημείο B, να βρεθεί το μονώνυμο που εκφράζει την απόσταση AB.



### Λύση

Από τη Φυσική γνωρίζουμε ότι η απόσταση AE δίνεται από τον τύπο

$$AE = \frac{1}{2} gt^2, \text{ όπου } g = 10 \text{ m/sec}^2$$

περίπου. Άρα  $AE = 5t^2$ .

Αν αφήναμε το σώμα να πέσει από το σημείο B, τότε θα έφτανε

στο έδαφος σε χρόνο  $\frac{t}{2}$  sec και θα

$$\text{ήταν } BE = \frac{1}{2} \cdot g \cdot \left(\frac{t}{2}\right)^2 =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot \frac{t^2}{4} = \frac{5}{4}t^2$$


Η απόσταση AB είναι  $AB = AE - BE =$

$$= 5t^2 - \frac{5}{4}t^2 = \frac{20}{4}t^2 - \frac{5}{4}t^2 = \frac{15}{4}t^2$$

**3** Μια τσιμεντένια κυλινδρική κολώνα, που έχει ακτίνα βάσης  $\rho$  και ύψος  $u$ , ενισχύεται περιμετρικά με τσιμέντο και αποκτά ακτίνα βάσης διπλάσια της αρχικής. Ο μηχανικός ισχυρίζεται ότι το τσιμέντο που προστέθηκε έχει όγκο τριπλάσιο του αρχικού όγκου της κολώνας. Είναι σωστός ο ισχυρισμός του;

## Λύση

Ο αρχικός όγκος της κολώνας ήταν  $V_1 = \pi r^2 u$ . Μετά την ενίσχυση της κολώνας, ο συνολικός όγκος της έγινε  $V_2 = \pi(2r)^2 u = \pi(4r^2)u = 4\pi r^2 u$ . Άρα το τσιμέντο που προστέθηκε έχει όγκο  $V_2 - V_1 = 4\pi r^2 u - \pi r^2 u = 3\pi r^2 u$ , που είναι πράγματι τριπλάσιος του αρχικού όγκου  $\pi r^2 u$  της κολώνας. Επομένως ο ισχυρισμός του μηχανικού είναι σωστός.





## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

**1** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ) αν είναι λανθασμένες.

α) Το άθροισμα ομοίων μονωνύμων είναι μονώνυμο.

β) Η διαφορά δύο μονωνύμων είναι μονώνυμο.

γ) Το γινόμενο μονωνύμων είναι μονώνυμο.

δ) Το πηλίκο δύο μονωνύμων είναι μονώνυμο.

**2** Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

α)  $-5x^2 + 2x^2 = \dots\dots$

β)  $-5x^2 \cdot 2x^3 = \dots\dots$

γ)  $3x - 2y + 2x = \dots\dots$

δ)  $4x^2y - yx^2 = \dots\dots$

ε)  $2xy \cdot y^2 = \dots\dots$

στ)  $(6x^3y) : (3xy) = \dots\dots\dots$

$$\zeta) 5x^4\omega^3 (\dots) = -10x^6\omega^4$$

$$\eta) \frac{-12x^3y}{\dots\dots} = \frac{4x^2}{y}$$

$$\theta) 3x^2y - \dots\dots = -4x^2y$$



## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

**1** Να κάνετε τις πράξεις:

$$\alpha) -7x^2y + 4x^2y \quad \beta) 4ax^2 - 6ax^2 + ax^2$$

$$\gamma) 6x^3 - \frac{9}{2}x^3$$

$$\delta) 0,25\alpha\beta - 0,35\alpha\beta + 0,5\alpha\beta$$

$$\epsilon) \frac{2}{5}xy^2\omega^4 - 1,2xy^2\omega^4$$

$$\sigma\tau) -3\sqrt{2}x^2 + 4\sqrt{2}x^2 - \sqrt{2}x^2$$

**2** Να υπολογίσετε τα γινόμενα:

$$\alpha) -3x \cdot 5x^2$$

$$\beta) 6x^2 \cdot \frac{3}{4}x^3$$

$$\gamma) 2xy^3 \cdot (-3x^2y) \quad \delta) -3x^2y \cdot (-2xy^4\omega)$$

$$\epsilon) -\frac{1}{3}\alpha\beta^3 \cdot 4\alpha\beta^3 \quad \sigma\tau) \frac{4}{3}x^3\alpha^2 \cdot \left(-\frac{1}{4}x\alpha^3\right)$$

$$\zeta) \left(-\frac{2}{5}xy^3\right) \cdot (-3x^2\omega) \cdot \left(-\frac{5}{6}y\omega^3\right)$$

**3** Να υπολογίσετε τα πηλίκα:

$$\alpha) 12\alpha^3 : (-3\alpha) \quad \beta) 8x^2y : (2xy^2)$$

$$\gamma) \left(-\frac{1}{3}\alpha^3\beta^5\right) : \left(\frac{6}{5}\alpha^2\beta^2\right)$$

$$\delta) (0,84x^2\omega^5) : (-0,12x\omega^3)$$

$$\epsilon) (-x^3\alpha^4\omega) : \left(-\frac{1}{4}x^2\alpha\right)$$

$$\sigma\tau) (0,5\alpha^3\beta^7) : \left(-\frac{7}{10}\alpha^2\beta^2\right)$$






**4** Να κάνετε τις πράξεις:

α)  $\left(-\frac{1}{3}x^2y\right)^2 (6xy^3)$


β)  $(-2x^2y^3)^3 : (-8x^3y^4)$

γ)  $(-2xy^4\omega^3)^2 \cdot (-x^2y)^3$

**5** Να βρείτε το εμβαδόν των παρακάτω σχημάτων. Ποιες από τις εκφράσεις που βρήκατε είναι μονώνυμα;



**6** Να συγκρίνετε το εμβαδόν του πράσινου τριγώνου με το άθροισμα των εμβαδών των κίτρινων τριγώνων.



## 1.3. Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων



✓ Μαθαίνω τι είναι πολυώνυμο, ποιος είναι ο βαθμός ενός



πολυωνύμου και διακρίνω αν δύο πολυώνυμα είναι ίσα.

✓ Μαθαίνω να προσθέτω και να αφαιρώ πολυώνυμα.

### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Να γράψετε τρία όμοια μονώνυμα με δύο μεταβλητές και να βρείτε το άθροισμα τους.

2. Να γράψετε τρία μονώνυμα με δύο μεταβλητές που δεν είναι όμοια. Μπορείτε τώρα να βρείτε ένα μονώνυμο ίσο με το άθροισμα τους;

3. Να βρείτε το βαθμό κάθε μονωνύμου της προηγούμενης

ερώτησης, ως προς κάθε μεταβλητή και ως προς τις δύο μεταβλητές.

## Πολυώνυμα

Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε, ότι το άθροισμα ομοίων μονωνύμων είναι μονώνυμο όμοιο με αυτά. Αν δύο τουλάχιστον μονώνυμα δεν είναι όμοια, τότε το άθροισμά τους δεν είναι μονώνυμο αλλά μια αλγεβρική παράσταση, που λέγεται **πολυώνυμο**. π.χ.

$$3x^2y + 2xy^4 - 5x^3y^3$$

Κάθε μονώνυμο που περιέχεται σε ένα πολυώνυμο λέγεται **όρος** του πολυωνύμου.

Το πολυώνυμο  $3x^2y + 2xy^4 - 5x^3y^3$  έχει τρεις όρους που είναι τα μονώνυμα  $3x^2y$ ,  $2xy^4$ ,  $-5x^3y^3$ .

Ειδικότερα, ένα πολυώνυμο που δεν έχει όμοιους όρους λέγεται

- διώνυμο, αν έχει δύο όρους
- τριώνυμο, αν έχει τρεις όρους.

$$3\alpha^2 - 2\beta$$
$$2x^2 - 3x + 4$$

**Βαθμός** ενός πολυωνύμου ως προς μία ή περισσότερες μεταβλητές του, είναι ο μεγαλύτερος από τους βαθμούς των όρων του.

Το πολυώνυμο  $3x^2y + 2xy^4 - 5x^3y^3$  είναι:

3ου βαθμού ως προς  $x$ ,

4ου βαθμού ως προς  $y$ ,

6ου βαθμού ως προς  $x$  και  $y$ .

Συμφωνούμε, ακόμα, ότι κάθε αριθμός μπορεί να θεωρηθεί και ως πολυώνυμο, οπότε λέγεται **σταθερό πολυώνυμο**. Ειδικότερα, ο αριθμός

μηδέν λέγεται μηδενικό πολυώνυμο και δεν έχει βαθμό, ενώ κάθε άλλο σταθερό πολυώνυμο είναι μηδενικού βαθμού.

Το πολυώνυμο  $-3x + 2x^2 + 5$  έχει μία μεταβλητή την  $x$  και για συντομία συμβολίζεται  $P(x)$  ή  $Q(x)$  ή  $A(x)$  κ.τ.λ.

Το πολυώνυμο  $P(x) = -3x + 2x^2 + 5$  είναι δευτέρου βαθμού και μπορούμε να το γράψουμε έτσι, ώστε κάθε όρος του να είναι μεγαλύτερου βαθμού από τον επόμενο του.

Δηλαδή,  $P(x) = 2x^2 - 3x + 5$ .

Τότε, λέμε, ότι γράφουμε το πολυώνυμο κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του  $x$ .

Η αριθμητική τιμή του πολυώνυμου  $P(x)$  για  $x = 5$ , συμβολίζεται με  $P(5)$  και είναι:

$$P(5) = 2 \cdot 5^2 - 3 \cdot 5 + 5 = 50 - 15 + 5 = 40.$$

Δύο πολυώνυμα είναι ίσα, όταν έχουν όρους ίσα μονώνυμα.

Τα πολυώνυμα  $3x^2 - 5x + 1$  και  $ax^2 + bx + 1$  είναι ίσα, αν  $a = 3$  και  $b = -5$ .

## Αναγωγή ομοίων όρων

Αν σε ένα πολυώνυμο υπάρχουν όμοια μονώνυμα, ή όπως λέμε όμοιοι όροι, τότε μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε με το άθροισμά τους. Η εργασία αυτή λέγεται αναγωγή ομοίων όρων.

$$\begin{aligned} 2\alpha^2 - 3\beta + 4\alpha^2 - 5\beta &= \\ 2\alpha^2 + 4\alpha^2 - 3\beta - 5\beta &= 6\alpha^2 - 8\beta \end{aligned}$$

Η αρχική αλγεβρική παράσταση, που είχε τέσσερις όρους, συμπύχθηκε σε μία άλλη με δύο όρους.

## Πρόσθεση - Αφαίρεση πολυωνύμων

Μπορούμε να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε πολυώνυμα χρησιμοποιώντας τις γνωστές ιδιότητες των πραγματικών αριθμών.

Για παράδειγμα, τα πολυώνυμα

$$A(x) = 3x^3 - 2x^2 - 7x - 5 \text{ και}$$

$B(x) = 2x^3 - x^2 + x$  έχουν άθροισμα ή διαφορά που βρίσκουμε ως εξής:

$$\begin{aligned} A(x) + B(x) &= \\ &= (3x^3 - 2x^2 - 7x - 5) + (2x^3 - x^2 + x) = \\ & \text{(Απαλείφουμε τις παρενθέσεις)} \\ &= 3x^3 - 2x^2 - 7x - 5 + 2x^3 - x^2 + x = \\ & \text{(Κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων)} \\ &= 5x^3 - 3x^2 - 6x - 5. \end{aligned}$$

Ομοίως, έχουμε:

$$\begin{aligned} A(x) - B(x) &= \\ &= (3x^3 - 2x^2 - 7x - 5) - (2x^3 - x^2 + x) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 3x^3 - 2x^2 - 7x - 5 - 2x^3 + x^2 - x = \\ &= x^3 - x^2 - 8x - 5. \end{aligned}$$



## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

**1** α) Να γραφεί το πολυώνυμο

$P(x) = 4x^2 - 8x + ax^3 - 5$  κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του  $x$  και να βρεθεί ο βαθμός του.

β) Αν το  $P(x)$  είναι ίσο με το πολυώνυμο  $Q(x) = \beta x^2 + \gamma x + \delta$ , ποιες είναι οι τιμές των  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ;

### Λύση

α) Το πολυώνυμο

$P(x) = 4x^2 - 8x + ax^3 - 5$ , κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του  $x$  γράφεται  $P(x) = ax^3 + 4x^2 - 8x - 5$ . Το  $P(x)$  είναι τρίτου βαθμού, αν  $\alpha \neq 0$  και δευτέρου βαθμού, αν  $\alpha = 0$ .

β) Τα πολυώνυμα

$$P(x) = \alpha x^3 + 4x^2 - 8x - 5 \text{ και}$$

$$Q(x) = \beta x^2 + \gamma x + \delta \text{ είναι ίσα, αν}$$

$\alpha = 0, \beta = 4, \gamma = -8 \text{ και } \delta = -5.$

**2** Μια βιοτεχνία ρούχων για να κατασκευάσει  $x$  πουκάμισα ξοδεύει ημερησίως 500 € για μισθούς υπαλλήλων, 10 € για τα υλικά που απαιτεί κάθε πουκάμισο (ύφασμα, κλωστές, ...) και  $\frac{1}{2}x^2$  € για τα υπόλοιπα έξοδά της (μεταφορικά, ηλεκτρικό ρεύμα ...). Πόσα ξοδεύει ημερησίως για την κατασκευή  $x$  πουκαμίσων; Ποια θα είναι τα έξοδα της βιοτεχνίας, αν κατασκευάσει 50 πουκάμισα;

**Λύση**

Τα έξοδα των υλικών για την κατασκευή ενός πουκάμισου είναι 10 €, οπότε για τα  $x$  πουκάμισα τα

έξοδα των υλικών θα είναι  $10x$  €. Το συνολικό ποσό σε €, που ξοδεύει ημερησίως η βιοτεχνία είναι

$$P(x) = \frac{1}{10} x^2 + 10x + 500$$

Για την κατασκευή 50 πουκάμισων τα έξοδα είναι:

$$\begin{aligned} P(50) &= \frac{1}{10} 50^2 + 10 \cdot 50 + 500 = \\ &= \frac{1}{10} 2500 + 500 + 500 = 1250 \text{ €} \end{aligned}$$

**3** Αν  $P(x) = x^2 - 3x + 4$ , να προσδιοριστεί το πολυώνυμο  $Q(x) = P(2x) - P(-x)$ .

**Λύση**

Το πολυώνυμο  $P(2x)$  προκύπτει, αν στο  $P(x)$  θέσουμε, όπου  $x$  το  $2x$ , οπότε έχουμε:

$$P(2x) = (2x)^2 - 3(2x) + 4 = 4x^2 - 6x + 4$$

Το πολυώνυμο  $P(-x)$  προκύπτει, αν στο  $P(x)$  θέσουμε, όπου  $x$  το  $-x$ , οπότε έχουμε:

$$P(-x) = (-x)^2 - 3(-x) + 4 = x^2 + 3x + 4.$$

$$\begin{aligned} \text{Άρα: } Q(x) &= P(2x) - P(-x) = \\ &= (4x^2 - 6x + 4) - (x^2 + 3x + 4) = \\ &= 4x^2 - 6x + 4 - x^2 - 3x - 4 = 3x^2 - 9x \end{aligned}$$



## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

**1** Ποιες από τις παρακάτω αλγεβρικές παραστάσεις είναι πολυώνυμα;

α)  $4x^3 - 5x^2 + 2x - \frac{1}{x}$     β)  $3x^4 - 7x^2 - 12$

γ)  $\sqrt{2}x^2y - 5xy + y^2 + \frac{1}{3}$

δ)  $x^3 + 2x^2y - \sqrt{xy^2} + 3y^3$

**2** Ποια από τα παρακάτω πολυώνυμα είναι 2ου βαθμού ως προς  $x$ ;

α)  $7 - 3x - 2x^2$

β)  $3x^2 - 5x - 3x^2 + 10$

γ)  $4x^3 + x^2 - 3x^3 + 2x - x^3 + 6$

δ)  $2xy - 3y + 9$

**3** Ένας μαθητής θέλοντας να υπολογίσει το άθροισμα και τη διαφορά των πολυωνύμων  $4x^3 - 8x^2 + x + 7$  και  $x^3 - 6x + 2$  έγραψε

**Άθροισμα**

$$\begin{array}{r} 4x^3 - 8x^2 + x + 7 \\ + \quad x^3 \qquad \qquad -6x + 2 \\ \hline \end{array}$$

$$5x^3 - 8x^2 - 5x + 9$$

**Διαφορά**

$$\begin{array}{r} 4x^3 - 8x^2 + x + 7 \\ + \quad -x^3 \qquad \qquad + 6x - 2 \\ \hline \end{array}$$

$$3x^3 - 8x^2 + 7x + 5$$

Είναι σωστός ο τρόπος που εφάρμοσε; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.

**4** Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Το πολυώνυμο που πρέπει να προσθέσουμε στο  $2x^2 + 5x + 7$  για να βρούμε άθροισμα  $8x^2 + 4x - 5$  είναι το:

- α)  $6x^2 + x - 2$       β)  $10x^2 + 9x + 2$   
γ)  $6x^2 - x - 12$       δ)  $-6x^2 + x + 12$ .

**5** Τα πολυώνυμα  $A(x)$ ,  $B(x)$  και  $\Gamma(x)$  έχουν βαθμούς 2, 3 και 2 αντιστοίχως.

α) Να βρείτε το βαθμό του πολυώνυμου  $A(x) + B(x)$ .

β) Αν το πολυώνυμο  $A(x) + \Gamma(x)$  δεν είναι το μηδενικό, τι βαθμό μπορεί να έχει;



## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

**1** Να γράψετε τα πολυώνυμα κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του  $x$ .

α)  $P(x) = 3x - 5x^2 + x^4 + 10 + 2x^3$

β)  $Q(x) = -6x + 2x^3 + 1$

γ)  $A(x) = -3x^2 + 7 + 2x^3 + 7x$

δ)  $B(x) = x - x^4 - 5$

**2** Δίνεται το πολυώνυμο

$$A = -2xy^2 + y^3 + 2x^3 - xy^2.$$

α) Να βρείτε την αριθμητική του τιμή για  $x = 2$  και  $y = -1$ .

β) Να γράψετε το πολυώνυμο κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του  $y$ . Ποιος είναι ο βαθμός του ως προς  $x$  και  $y$ ;

**3** Αν  $P(x) = 2x^2 + 2x - 9$ , να αποδείξετε ότι:


α)  $P(-3) = P(2)$      β)  $3P(1) + P(3) = 0$

**4** Η επιφάνεια ενός σταδίου αποτελείται από δύο ημικυκλικούς δίσκους και ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, που έχει μήκος 100 μέτρα και πλάτος  $2x$  μέτρα.

α) Να βρείτε την περίμετρο και το εμβαδόν του.

β) Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν του, αν το πλάτος του είναι ίσο με 60 μέτρα.

100 m



**5** Να κάνετε τις πράξεις:

α)  $(2x^2 - x) - (x^3 - 5x^2 + x - 1)$

β)  $-3x^2y - (2xy - yx^2) + (3xy - y^3)$

γ)  $(2\alpha^2 - 3\alpha\beta) - (\beta^2 + 4\alpha\beta) - (\alpha^2 + \beta^2)$

δ)  $2\omega^2 - [4\omega - 3 - (\omega^2 + 5\omega)]$

$$\varepsilon) \left( \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x + 1 \right) - \left( \frac{1}{6}x + x^2 - \frac{1}{3} \right)$$

$$\sigma\tau) (0,4x^3 + 2,3x^2) + (3,6x^3 - 0,3x^2 + 4)$$

**6** Αν  $A(x) = 2x^3 - x^2 + x - 4$ ,

$B(x) = -3x^3 + 5x - 2$  και

$T(x) = 4x^2 - 3x + 8$ , να βρείτε τα

πολυώνυμα:

α)  $A(x) - B(x)$       β)  $A(x) + T(x)$

γ)  $T(x) - [A(x) + B(x)]$

**7** Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ισότητες:

α)  $(\dots - 4x \dots) + (x^2 \dots + 4) = -6x^2 - 8x + 7$

β)  $(-x^3 \dots + 8) - \dots + x^2 \dots) = x^3 - x^2 + 5x + 9$

**8** Να συμπληρώσετε το παρακάτω τετράγωνο ώστε να είναι μαγικό- (Τα τρία πολυώνυμα οριζοντίως,


καθέτως και διαγωνίως έχουν το ίδιο άθροισμα)

$2x^2+2x-3$	$7x^2+3x-4$	
$9x^2-3x+2$		
$4x^2+4x-5$		

**9** Αν  $P(x) = (-5x^2 + 4x - 3) - (x^2 - 2x + 1) + (3x^2 + x)$  και  $Q(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ , να βρείτε τις τιμές των  $\alpha, \beta, \gamma$ , ώστε τα πολυώνυμα  $P(x)$  και  $Q(x)$  να είναι ίσα

**10** Ένας ποδηλάτης ξεκινάει από το σημείο A και σε χρόνο  $t$  sec κατεβαίνει το δρόμο AB με επιτάχυνση  $a = 2 \text{ m/sec}^2$ . Όταν φτάσει στο σημείο B, συνεχίζει να κινείται στο δρόμο ΒΓ για 10 sec με

σταθερή ταχύτητα. Να βρείτε την παράσταση που εκφράζει την απόσταση που διήνυσε ο ποδηλάτης. Ποια απόσταση διήνυσε ο ποδηλάτης, αν  $t = 5 \text{ sec}$ ;



## 1.4. Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων



**Μαθαίνω να  
πολλαπλασιάζω:**

✓ **Μονώνυμο με  
πολυώνυμο**



✓ **Πολυώνυμο με πολυώνυμο**

### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

**1.** Να γράψετε το γινόμενο  $a(b + c)$  σύμφωνα με την επιμεριστική ιδιότητα και με ανάλογο τρόπο να βρείτε την παράσταση  $3x^2(2x^3 + 6x)$ .

**2.** Να γράψετε το γινόμενο  $(a + b)(c + d)$  σύμφωνα με την επιμεριστική ιδιότητα και με ανάλογο τρόπο να βρείτε την παράσταση  $(3x^2y + 2y)(2x^2 + 5)$ .

## Πολλαπλασιασμός μονωνύμου με πολυώνυμο

Την αλγεβρική παράσταση  $3x^2(2x^3 + 6x)$  που είναι γινόμενο του μονωνύμου  $3x^2$  με το πολυώνυμο  $2x^3 + 6x$ , σύμφωνα με την επιμεριστική ιδιότητα, μπορούμε να τη γράψουμε  $3x^2(2x^3 + 6x) = 3x^2 \cdot 2x^3 + 3x^2 \cdot 6x = 6x^5 + 18x^3$

Διαπιστώνουμε ότι:

Για να πολλαπλασιάσουμε μονώνυμο με πολυώνυμο, πολλαπλασιάζουμε το μονώνυμο με κάθε όρο του πολυωνύμου και προσθέτουμε τα γινόμενα που προκύπτουν.

## Πολλαπλασιασμός πολυωνύμου με πολυώνυμο

Την αλγεβρική παράσταση

$(3x^2y + 2y)(2x^2 + 5)$  που είναι  
γινόμενο του πολυωνύμου  
 $3x^2y + 2y$  με το πολυώνυμο  $2x^2 + 5$ ,  
σύμφωνα με την επιμεριστική  
ιδιότητα, μπορούμε να τη  
γράψουμε

$$\begin{aligned}(3x^2y + 2y)(2x^2 + 5) &= 3x^2y \cdot 2x^2 + \\ &+ 3x^2y \cdot 5 + 2y \cdot 2x^2 + 2y \cdot 5 = \\ &= 6x^4y + 15x^2y + 4x^2y + 10y = \\ &= 6x^4y + \underbrace{15x^2y + 4x^2y} + 10y \\ &= 6x^4y + 19x^2y + 10y\end{aligned}$$

**Διαπιστώνουμε ότι:**

**Για να πολλαπλασιάσουμε  
πολυώνυμο με πολυώνυμο,  
πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο του  
ενός πολυωνύμου με κάθε όρο του  
άλλου πολυωνύμου και  
προσθέτουμε τα γινόμενα που  
προκύπτουν.**

Όταν κάνουμε πολλαπλασιασμό μονωνύμου με πολυώνυμο ή δύο πολυωνύμων, λέμε ότι αναπτύσσουμε τα γινόμενα αυτά και το αποτέλεσμα ονομάζεται **ανάπτυγμα του γινομένου**.



## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

**1** Να γίνουν οι πράξεις:

$$\alpha) -\frac{2}{3}x^2y\left(x - \frac{1}{3}y - 3\right)$$

$$\beta) (2x^2 - 5x + 6)(x - 2)$$

$$\gamma) 4x(-2x^2 + 3x - 1) - 3x^2(-2x + 5)$$

$$\delta) -2x^2(x + 4)(x - 1)$$

### Λύση

$$\alpha) -\frac{2}{3}x^2y\left(x - \frac{1}{3}y - 3\right) =$$

$$= -\frac{2}{3}x^3y + \frac{2}{9}x^2y^2 + 2x^2y$$

$$\begin{aligned}\beta) (2x^2 - 5x + 6)(x - 2) &= \\ &= 2x^3 - 4x^2 - 5x^2 + 10x + 6x - 12 = \\ &= 2x^3 - 9x^2 + 16x - 12\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}\gamma) 4x(-2x^2 + 3x - 1) - 3x^2(-2x + 5) &= \\ &= -8x^3 + 12x^2 - 4x + 6x^3 - 15x^2 = \\ &= -2x^3 - 3x^2 - 4x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\delta) -2x^2(x + 4)(x - 1) &= \\ &= -2x^2(x^2 - x + 4x - 4) = \\ &= -2x^2(x^2 + 3x - 4) = \\ &= -2x^4 - 6x^3 + 8x^2\end{aligned}$$

► Ο πολλαπλασιασμός δύο πολυ-  
ωνύμων μπορεί να γίνει όπως και ο  
πολλαπλασιασμός των αριθμών.  
Για παράδειγμα, ο πολλαπλασια-  
σμός του (β) ερωτήματος  
 $(2x^2 - 5x + 6)(x - 2)$  γίνεται και ως  
εξής:

$$\begin{array}{r}
 2x^2 - 5x + 6 \\
 \underline{x - 2} \\
 -2 \cdot (2x^2 - 5x + 6) \rightarrow -4x^2 + 10x - 12 \\
 x \cdot (2x^2 - 5x + 6) \rightarrow + 2x^3 - 5x^2 + 6x \\
 \hline
 2x^3 - 9x^2 + 16x - 12
 \end{array}$$

**2** Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η πρόσοψη μιας πόρτας, που είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Αν ένα μέρος της πόρτας είναι διακοσμητικό τζάμι, να προσδιοριστεί το πολυώνυμο που εκφράζει το εμβαδόν του αλουμινίου, το οποίο απαιτείται για την κατασκευή της πρόσοψης της πόρτας.



## Λύση

Η πόρτα έχει σχήμα ορθογωνίου με διαστάσεις  $2x + y$  και  $4x + 10$ , οπότε έχει εμβαδόν  $(2x + y)(4x + 10)$ .

Το διακοσμητικό τζάμι έχει σχήμα ορθογωνίου με διαστάσεις  $y$  και  $x + 10$ , οπότε έχει εμβαδόν  $y(x + 10)$ .

Επομένως, το εμβαδόν του αλουμινίου που απαιτείται για την κατασκευή της πρόσοψης της πόρτας είναι:

$$\begin{aligned} & (2x + y)(4x + 10) - y(x + 10) = \\ & = 8x^2 + 20x + 4xy + 10y - xy - 10y = \\ & = 8x^2 + 20x + 3xy \end{aligned}$$



## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

**1** Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε παράσταση της στήλης Α, το αποτέλεσμα της από τη στήλη Β.

Στήλη Α
α. $x(x + 1)$
β. $(x + 1)(x - 1)$
γ. $x(x - 1)$
δ. $(x + 1)(1 + x)$
ε. $(x + 1)(x + 2)$

Στήλη Β
1. $x^2 - x$
2. $x^2 + 1$
3. $x^2 + 2x + 1$
4. $x^2 + 2x + 3$
5. $x^2 + x$
6. $x^2 + 3x + 2$
7. $x^2 - 1$

α	β	γ	δ	ε

**2** Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ) αν είναι λανθασμένες.

α) Αν το πολυώνυμο  $P(x)$  έχει βαθμό 3 και το πολυώνυμο  $Q(x)$  έχει βαθμό 2, τότε το πολυώνυμο  $P(x) \cdot Q(x)$  έχει βαθμό 6.

β) Αν το πολυώνυμο  $P(x) \cdot Q(x)$  έχει βαθμό 7 και το πολυώνυμο  $P(x)$  έχει βαθμό 3, τότε το πολυώνυμο  $Q(x)$  έχει βαθμό 4.

**3** Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά:

α)  $x(2x + \dots) = \dots + 4x$

β)  $3x^2(\dots - 2) = 3x^3y$

γ)  $(x + 5)(\dots + 3) = 2x^2 + \dots + 10x + \dots$

δ)  $(x^2 + y)(x - \dots) = \dots x^2y^2 + \dots - y^3$

**4** Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

i) Ο όγκος του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου είναι:

α)  $3x + 1$

β)  $x^3 + 1$

γ)  $x^3 + x^2$

δ)  $x^3 + x$


ii) Το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου είναι:

α)  $6x^2 + 4x + 1$

β)  $4x^2 + 6x$

γ)  $6x^2 + 4x + 2$

δ)  $6x^2 + 4x$



**5** Ο καθηγητής των Μαθηματικών ζήτησε από τους μαθητές του να γράψουν την αλγεβρική παράσταση που εκφράζει το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔ και οι μαθητές του έδωσαν τις εξής απαντήσεις:


$$\alpha) (x + 2)(x + 3)$$

$$\beta) 2x \cdot 3x$$

$$\gamma) x^2 + 6$$

$$\delta) x^2 + 5x + 6$$

Ποιές απ' αυτές είναι σωστές;



## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



**1** Να κάνετε τις πράξεις:

$$\alpha) -3x^2y(-5x + 2y)$$

$$\beta) 4x(2x^2 - x + 2) - 8x$$

$$\gamma) -5x(2x - 3) - 3x(2 - 3x)$$

$$\delta) 2xy(x^2 - 3y^2) - 4x(x^2y - 2y^3)$$

**2** Να κάνετε τις πράξεις:

α)  $(2\alpha - 3\beta)(-4\alpha + 2\beta)$

β)  $(x^2 - 2x + 4)(x + 2) - 8$

γ)  $3x^2(-2x + 3)(5 - x)$

δ)  $(4 - 3x)(5 - 2x) - 6x(x - 4)$

ε)  $(2x^2 - 3x - 4)(-3x^2 + x)$

στ)  $(3x^2 - 2xy - 5y^2)(4y - x)$

**3** Να κάνετε τις πράξεις:

α)  $(3x - 2)(x^2 - x)(4x - 3)$

β)  $-2x(x^2 - x + 1)(x - 2) -$   
 $-(x - 1)(2x - 3)(x + 2)$

γ)  $(-2x + y)(x^2 - 3xy) -$   
 $-(3x - y)(4x + y)(-2x - 3y)$

**4** Να αποδείξετε τις ισότητες:

α)  $(x^2 - 4x + 4)(x^2 + 4x + 4) -$   
 $x^2(x^2 - 8) - 16 = 0$

β)  $(3\alpha + 8\beta)(\beta - \alpha) - (\alpha + 2\beta)(\beta - 3\alpha) =$   
 $= 6\beta^2$

**5** Αν  $P(x) = -2x^2 + 5x - 3$  και  $Q(x) = 4x - 5$ , να βρείτε τα πολυώνυμα:


α)  $P(x) \cdot Q(x)$

β)  $P(x) \cdot [-3Q(x) + 11x - 12]$

γ)  $[P(x) - 2] \cdot [Q(x) + 3]$

**6** Αν  $P(x) = 3x(-2x + 4)(x - 1)$  και  $Q(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ , να βρείτε τις τιμές των  $a, b, c, d$ , ώστε τα πολυώνυμα  $P(x)$  και  $Q(x)$  να είναι ίσα.

**7** Να βρείτε την πλευρά τετραγώνου που έχει εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν του παρακάτω σχήματος.



**8** Ένα οικόπεδο έχει σχήμα ορθογωνίου με πλάτος  $x$  μέτρα και με μήκος μεγαλύτερο από το πλάτος του κατά 5 μέτρα. Αν το μήκος ελαττωθεί κατά 3 μέτρα και το πλάτος ελαττωθεί κατά 1 μέτρο, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του οικοπέδου θα μειωθεί κατά  $4x + 2$  τετραγωνικά μέτρα.

# Περιεχόμενα 1ου τόμου

## ΜΕΡΟΣ Α΄ • ΑΛΓΕΒΡΑ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

#### ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.1 – Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις - συμπληρώσεις).....	17
Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους.....	17
Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών.....	35
Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού.....	45
1.2 – Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα.....	61
Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα.....	61
Β. Πράξεις με μονώνυμα.....	78

<b>1.3 – Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων .....</b>	<b>91</b>
<b>1.4 – Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων .....</b>	<b>108</b>

**Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').**

**Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού / ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.**